



凸集与凸函数

翟卫欣 副教授

zhaiweixin@cau.edu.cn

中国农业大学信息与电气工程学院



- 凸集与凸函数是最优化方法理论分析中较为重要的一部分内容。
- 凸集、凸函数本身具有较好的性质。许多算法都是以凸集、凸函数为基础进行证明的。



目录

凸集

投影定理

凸集的分离定理

凸函数

凸函数的判别定理





目录

凸集

投影定理

凸集的分离定理

凸函数

凸函数的判别定理





凸集的定义

- 设集合 $D \subset \mathbb{R}^n$, 如果对于任意的 $x, y \in D$ 与任意的 $\alpha \in [0, 1]$, 有 $\alpha x + (1 - \alpha)y \in D$, 则称 D 是凸集 (convex set)。
- 凸集的几何意义是: 如果两个点属于此集合, 则这两点连线上的任意一点均属于此集合。




图 1: 凸集示例



凸集的性质

- 设 $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集, $\alpha \in \mathbb{R}$, 则
 - (1) $D_1 \cap D_2 = \{x | x \in D_1, x \in D_2\}$ 是凸集。
 - (2) $\alpha D_1 = \{\alpha x | x \in D_1\}$ 是凸集。
 - (3) $D_1 + D_2 = \{x + y | x \in D_1, y \in D_2\}$ 是凸集。
 - (4) $D_1 - D_2 = \{x - y | x \in D_1, y \in D_2\}$ 是凸集。



凸集的性质

- 设 $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集, 则
(1) $D_1 \cap D_2 = \{x | x \in D_1, x \in D_2\}$ 是凸集。
- 证明: 任取 $x_1 \in D_1 \cap D_2, x_2 \in D_1 \cap D_2$,
由于, $x_1, x_2 \in D_1$, 所以任取 $\alpha' \in [0, 1]$, 有 $\alpha' x_1 + (1 - \alpha') x_2 \in D_1$
由于, $x_1, x_2 \in D_2$, 所以任取 $\alpha' \in [0, 1]$, 有 $\alpha' x_1 + (1 - \alpha') x_2 \in D_2$
所以, 任取 $x_1, x_2 \in D_1 \cap D_2$, 有 $\alpha' x_1 + (1 - \alpha') x_2 \in D_1 \cap D_2$
所以, $D_1 \cap D_2$ 是凸集。



凸集的性质

- 设 $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集, $\alpha \in \mathbb{R}$, 则

(2) $\alpha D_1 = \{\alpha x | x \in D_1\}$ 是凸集。

- 证明: $\alpha = 0$ 时, αD_1 是凸集。

$\alpha \neq 0$ 时, 对任意 $x_1, x_2 \in D_1$, 任取 $\alpha' \in [0, 1]$, 有 $\alpha' x_1 + (1 - \alpha') x_2 \in D_1$

由于, αD_1 中的任一元素都可写成 $\alpha x, x \in D_1$ 的形式,

所以, 任取 $\alpha x_1, \alpha x_2 \in \alpha D_1$, 任取 $\alpha' \in [0, 1]$, 都有 $\alpha' \alpha x_1 + (1 - \alpha') \alpha x_2 = \alpha(\alpha' x_1 + (1 - \alpha') x_2)$,

由于, $\alpha' x_1 + (1 - \alpha') x_2 \in D_1$, 所以 $\alpha(\alpha' x_1 + (1 - \alpha') x_2) \in \alpha D_1$

所以, αD_1 是凸集。



凸集的性质

- $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集, 则

(3) $D_1 + D_2 = \{x + y | x \in D_1, y \in D_2\}$ 是凸集。

- 证明: 任取 $x_1, x_2 \in D_1, y_1, y_2 \in D_2$,

由于, $x_1, x_2 \in D_1$, 所以任取 $\alpha' \in [0, 1]$, 有 $\alpha' x_1 + (1 - \alpha') x_2 \in D_1$

由于, $y_1, y_2 \in D_2$, 所以任取 $\alpha' \in [0, 1]$, 有 $\alpha' y_1 + (1 - \alpha') y_2 \in D_2$

对任意 $x_1 + y_1, x_2 + y_2 \in D_1 + D_2$, 任取 $\alpha' \in [0, 1]$, 有 $\alpha' (x_1 + y_1) + (1 - \alpha') (x_2 + y_2) = \alpha' x_1 + (1 - \alpha') x_2 + \alpha' y_1 + (1 - \alpha') y_2$, 其中,

$\alpha' x_1 + (1 - \alpha') x_2 \in D_1, \alpha' y_1 + (1 - \alpha') y_2 \in D_2$,

所以, $\alpha' (x_1 + y_1) + (1 - \alpha') (x_2 + y_2) \in D_1 + D_2$,

所以, $D_1 + D_2$ 是凸集。



凸集的性质

- 设 $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集, 则
(4) $D_1 - D_2 = \{x - y | x \in D_1, y \in D_2\}$ 是凸集。
- 证明: 由凸集的性质 (2)、(3) 可直接推导得 (4)。



凸集定义的推广

- D 是凸集的充分必要条件是：对任意 $m \geq 2$ ，任意给定 $x_1, x_2, \dots, x_m \in D$ 和实数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ，且 $\alpha_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, m; \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1)$ ，均有 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m \in D$
- 证明：当 $m = 2$ 时，由凸集的定义，命题显然成立；
假设 $m = k$ 时命题成立，即任取 $x_i \in D, \alpha_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, k; \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1)$ ，则有 $\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \in D$ 。



凸集定义的推广

当 $m = k + 1$ 时, 任取 $\mathbf{x}_i \in \mathbf{D}, \alpha_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, k, k + 1; \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i = 1)$, 则有:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i \mathbf{x}_i &= \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{x}_i + \alpha_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} \\ &= \left(\sum_{i=1}^k \alpha_i \right) \left[\sum_{i=1}^k \frac{\alpha_i}{\sum_{i=1}^k \alpha_i} \mathbf{x}_i \right] + \alpha_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} \end{aligned}$$

由于 $\sum_{i=1}^k \frac{\alpha_i}{\sum_{i=1}^k \alpha_i} = 1$, 且 $\frac{\alpha_i}{\sum_{i=1}^k \alpha_i} \geq 0$, 因此由归纳法则有: $\sum_{i=1}^k \frac{\alpha_i}{\sum_{i=1}^k \alpha_i} \mathbf{x}_i \in \mathbf{D}$

由于 $\sum_{i=1}^k \alpha_i + \alpha_{k+1} = 1$, 所以 $\sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i \mathbf{x}_i \in \mathbf{D}$ 。



开集、闭集、有界集、无界集

- 开集：对集合内任意一点，沿任意一个方向移动一个足够短的距离，仍然在集合内；
- 闭集：对集合外任意一点，沿任意一个方向移动一个足够短的距离，仍然在集合外；
- 有界集：对集合内任意一点，沿任意一个方向移动足够长的距离，肯定在集合外；
- 无界集：对集合内任意一点，存在某一个方向，沿该方向移动任意长的距离，仍然在集合内。



开集、闭集、有界集、无界集

集合形式(\mathbb{R}^n 中)	开集	闭集	有界集	无界集
$\{\mathbf{x} 0 < \mathbf{x} < 1\}$	是	否	是	否
$\{\mathbf{x} 0 \leq \mathbf{x} \leq 1\}$	否	是	是	否
$\{\mathbf{x} 0 < \mathbf{x} \leq 1\}$	否	否	是	否
$\{\mathbf{x} \mathbf{x} > 0\}$	是	否	否	是
$\{\mathbf{x} \mathbf{x} \geq 0\}$	否	是	否	是
{空集}	是	是	是	否
$\{\mathbb{R}^n\}$	是	是	否	是
$\{(x,y) \text{当 } x > 0 \text{ 且 } y > 0 \text{ 时, 满足 } x^2 + y^2 < 1; \text{ 否则, 满足 } x^2 + y^2 \leq 1\}$	否	否	是	否



开集、闭集、有界集、无界集




图 2: 一个既非开集又非闭集的例子

$\{(x, y) \mid \text{当 } x > 0 \text{ 且 } y > 0 \text{ 时, 满足 } x^2 + y^2 < 1; \text{ 否则, 满足 } x^2 + y^2 \leq 1\}$



内点、边界、闭包

- 给定 $D \subset \mathbb{R}^n, x \in \mathbb{R}^n$ 。若存在 x 的 δ 邻域 $N_\delta(x) = \{y \mid \|y - x\| < \delta\} \subset D$ ，则称 x 为 D 的内点；所有内点组合成的集合记为 $\text{int}D$ 。
- 若 x 的任意 δ 邻域 $N_\delta(x)$ 既包含 D 中的点，又包含不属于 D 的点，则称 x 为 D 的边界点；所有边界点组成的集合记为 ∂D 。
- 若对任意 $\delta > 0$ 均有 $N_\delta(x) \cap D \neq \emptyset$ ，则称 x 属于集合的闭包，记为 $x \in \text{cl}D$ 。
- 根据以上定义可知，集合 D 的闭包 $\text{cl}D = D \cup \partial D$ ，它是包含集合 D 的最小的闭集。



集合的分离




图 3: 集合的分离示例

- 设 D_1, D_2 是两个非空集合, $\alpha \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}$, 若有

$$D_1 \subset H^+ = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha^T x \geq b\},$$

$$D_2 \subset H^- = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha^T x \leq b\},$$
 则称超平面 $H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha^T x = b\}$ 分离集合 D_1, D_2 。



目录

凸集

投影定理

凸集的分离定理

凸函数

凸函数的判别定理





投影定理

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是非空闭凸集, $y \in \mathbb{R}^n$ 且 $y \notin D$, 则

(1) 存在唯一的一点 $\bar{x} \in D$, 使得 $\bar{x} \in D$ 是 y 到 D 的距离最小的点 (距离大于0), 即有 $\| \bar{x} - y \| = \min\{ \| x - y \| \mid x \in D \} > 0$

(2) $\bar{x} \in D$ 是 y 到 D 的距离最小的点的充要条件是 $(x - \bar{x})^T(\bar{x} - y) \geq 0, \forall x \in D$

(1) 的证明, 先证明存在:

- 设有单位球 $S = \{s \mid \| s \| \leq 1, s \in \mathbb{R}^n\}$, 取充分大的 $\mu > 0$, 可使 $D \cap (y + \mu S) \neq \emptyset$ 。由于 D 是闭集, 所以 $D \cap (y + \mu S)$ 是非空有界闭集。
- 因此, 连续函数 $f(x) = \| y - x \|^2$ 在 $D \cap (y + \mu S)$ 上取到最小值, 这个最小值在 $\bar{x} \in D \cap (y + \mu S)$ 上达到, \bar{x} 是 y 到 D 的距离最小的点。
- 说明: $f(x)$ 是距离, y 到 μS 外的点的距离小于 y 到 μS 内的点的距离。



投影定理

(1) 的证明, 再证明唯一性:

- 设有 $\tilde{x} \in D, \tilde{x} \neq \bar{x}$, 使得 $\|\tilde{x} - y\| = \|\bar{x} - y\| = \gamma$, 则由于向量的和的模小于模的和, 所以

$$\left\| \frac{\bar{x} + \tilde{x}}{2} - y \right\| \leq \frac{1}{2} \|\tilde{x} - y\| + \frac{1}{2} \|\bar{x} - y\| = \gamma$$

- 由 D 是凸集知 $\frac{\bar{x} + \tilde{x}}{2} \in D$, 又因为 γ 是最小距离, 所以上式的等号成立, 即 $\left\| \frac{\bar{x} + \tilde{x}}{2} - y \right\| = \gamma$
- 所以 $\bar{x} - y$ 与 $\tilde{x} - y$ 同线且同向, 即 $\bar{x} - y = \lambda(\tilde{x} - y), \lambda > 0$, 又因为已知 $\|\tilde{x} - y\| = \|\bar{x} - y\| = \gamma$ 所以 $\lambda = 1$, 所以 $\bar{x} = \tilde{x}$, 唯一性得证。



投影定理

(2) 的证明, 先证明充分性:

- 对任意的 $x \in D$, 有

$$\begin{aligned}\|x - y\|^2 &= \|x - \bar{x} + \bar{x} - y\|^2 \\ &= \|x - \bar{x}\|^2 + \|\bar{x} - y\|^2 + 2(x - \bar{x})^T(\bar{x} - y)\end{aligned}$$

- 由于 $\|x - \bar{x}\|^2 \geq 0$ 且 $(x - \bar{x})^T(\bar{x} - y) \geq 0$, 所以有:
 $\|x - y\|^2 \geq \|\bar{x} - y\|^2$, 即 \bar{x} 是距离最小点。



投影定理

(2) 的证明, 再证明必要性:

- 由 \bar{x} 是 y 到 D 的最小点, 可知 $\|\bar{x} - y\| \leq \|x - y\|, \forall x \in D$, 或等价地有:

$$\|\bar{x} - y\|^2 \leq \|x - y\|^2, \forall x \in D$$

- 因为 $\bar{x} \in D$, 且 D 是凸集, 所以对任意的 $\alpha \in (0, 1)$ 有

$$\bar{x} + \alpha(x - \bar{x}) = \alpha x + (1 - \alpha)\bar{x} \in D$$

所以

$$\begin{aligned} \|\bar{x} - y\|^2 &\leq \|y - \bar{x} - \alpha(x - \bar{x})\|^2 \\ &\leq \|y - \bar{x}\|^2 + \alpha^2 \|x - \bar{x}\|^2 - 2\alpha(x - \bar{x})^T(y - \bar{x}) \end{aligned}$$

- 由此, 可得 $\alpha^2 \|x - \bar{x}\|^2 - 2\alpha(x - \bar{x})^T(y - \bar{x}) \geq 0, \forall \alpha \in (0, 1)$
- 上式两边同除以 α , 并令 $\alpha \rightarrow 0$, 可得 $(x - \bar{x})^T(\bar{x} - y) \geq 0, \forall \alpha \in (0, 1)$



投影定理

(2) 的必要性证明的补充

对于 $\alpha > 0$, 如果当 $\alpha \rightarrow 0$ 时 $o(\alpha) > 0$ 且 $o(\alpha) \rightarrow 0$, 则有

$$f(\mathbf{x}) + \frac{o(\alpha)}{\alpha} \leq 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \Rightarrow f(\mathbf{x}) < 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

$$f(\mathbf{x}) + \frac{o(\alpha)}{\alpha} \geq 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \Rightarrow f(\mathbf{x}) \geq 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$



目录

凸集

投影定理

凸集的分离定理

凸函数

凸函数的判别定理





点与凸集的分​​离定理

- 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是非空闭凸集, $y \in \mathbb{R}^n$, $y \notin D$, 则存在非零向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n, \beta \in \mathbb{R}$ 满足 $\alpha^T x \leq \beta < \alpha^T y, \forall x \in D$
- 证明: 由投影定理可知, 存在唯一的最小距离点 $\bar{x} \in D$ 满足 $(x - \bar{x})^T (\bar{x} - y) \geq 0, \forall x \in D$,
即 $x^T (y - \bar{x}) \leq \bar{x}^T (y - \bar{x}), \forall x \in D$
而 $\|y - \bar{x}\|^2 = (y - \bar{x})^T (y - \bar{x}) = y^T (y - \bar{x}) - \bar{x}^T (y - \bar{x}), \forall x \in D$
- 结合以上两式, 得 $\|y - \bar{x}\|^2 \leq y^T (y - \bar{x}) - x^T (y - \bar{x}), \forall x \in D$
- 令 $\alpha = y - \bar{x}$, 显然 $\alpha \neq 0$, 则上式成为 $0 < \|\alpha\|^2 \leq y^T \alpha - x^T \alpha, \forall x \in D$, 则 $\alpha^T x < \alpha^T y, \forall x \in D$
- 令 $\beta = \max\{\alpha^T x\}$, 则有 $\alpha^T x \leq \beta < \alpha^T y, \forall x \in D$



点与凸集的分​​离定理

- 推论1: 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是非空凸集, $y \in \partial D$, 则存在非零向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\alpha^T x \leq \alpha^T y, \forall x \in clD$
- 推论2: 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是非空凸集, $y \notin D$, 则存在非零向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\alpha^T x \leq \alpha^T y, \forall x \in clD$
- 注: cl 是闭包, ∂ 是边界



两个非空凸集的分离定理

- 设 $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}^n$ 是非空凸集, 且 $D_1 \cap D_2 = \emptyset$ 则存在非零向量 α 使得 $\inf\{\alpha^T x | x \in D_1\} \geq \sup\{\alpha^T x | x \in D_2\}$
- 证明: 令 $D' = D_2 - D_1 = \{z | z = x_2 - x_1, x_1 \in D_1, x_2 \in D_2\}$, 由于 D_1, D_2 非空, 所以 D' 非空, 由于 $D_1 \cap D_2 = \emptyset$, 所以 $0 \notin D'$, 根据点与凸集的分离定理的推论可知存在非零向量 α , 使得对每一个 $z \in D'$ 都有 $\alpha^T z \leq 0$, 即 $\alpha^T x_1 \geq \alpha^T x_2, \forall x_1 \in D_1, x_2 \in D_2$
- 命题得证
- 注: \sup 是supremum的简写, 上确界; \inf 是infimum的简写, 下确界, $\sup\{x | 1 < x < 2\} = \sup\{x | 1 \leq x \leq 2\} = 2$



支撑超平面定理




图 4: 支撑超平面示例

- 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是非空凸集, $\bar{x} \in \partial D$, 则存在非零向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 使得 $\alpha^T x \leq \alpha^T \bar{x}, \forall x \in \text{cl}D$; 此时也称超平面 $H = \{x \in \mathbb{R}^n | \alpha^T x = \alpha^T \bar{x}\}$ 为集合 D 在 \bar{x} 处的支撑超平面。



支撑超平面定理

- 证明：由于 $\bar{x} \in \partial D$ ，所以存在点列 $\{x_k\}$ ，使得 $x_k \rightarrow \bar{x}$ ，且 $x_k \notin \text{cl}D$ 。根据点与凸集的分离定理可知对于每个 x_k ，存在非零向量 $\alpha_k \in \mathbb{R}^n$ ，满足 $\alpha_k^T x < \alpha_k^T x_k, \forall x \in \text{cl}D$
不妨设 $\|\alpha_k\| = 1$ ，则 $\{\alpha_k\}$ 是有界序列，必存在收敛子列 $\{\alpha_k\}$ ，不妨仍记该收敛子列为 $\{\alpha_k\}$ 其收敛点为 α
- 取极限可得 $\alpha^T x \leq \alpha^T \bar{x}, \forall x \in \text{cl}D$ 。




Bolzano-Weierstrass定理


有界无穷序列必有收敛子列

证明:

- ① 设有一有界无穷序列 $\{x_n\}$ ，分别取它的一个下界 s 和一个上界 S ，记闭区间套 $I_1 = [s, S]$ ，将 I_1 分为两个长度相等的子区间；



- ② 由于 $\{x_n\}$ 是无穷序列，则 I_1 的两个子区间中至少有一个包含了 $\{x_n\}$ 中的无限多项，记该子区间为闭区间套 I_2 ；








Bolzano-Weierstrass定理

有界无穷序列必有收敛子列

- ③ 依此类推，可将 I_k 平分为两个子区间，其中之一必包含 $\{x_n\}$ 中的无限多项，记其为 I_{k+1} ， $k = 1, 2, \dots$ 。从而构造出一系列闭区间套 I_i ($i = 1, 2, \dots$)。由闭区间套定理， $\exists x$ ， $x \in I_i$ ($i = 1, 2, \dots$)。由于随着 i 的增大，闭区间套 I_i 的长度趋近于0，则 $\exists I_k \subseteq N(x)$ ，所以 $N(x)$ 中也包含了 $\{x_n\}$ 中的无限多项，且 x 为这无限多项的聚点，将这无限多项取出并构成子列 $\{x_{n_k}\}$ ，则该子列收敛于 x 。



⋮



目录

凸集

投影定理

凸集的分离定理

凸函数

凸函数的判别定理





凸函数

- 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是非空凸集, $f(x)$ 是定义在 D 上的函数, 如果对任意的 $x_1, x_2 \in D, \alpha \in (0, 1)$ 都有 $f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2)$, 则称 f 是 D 上的凸函数(convex function)。
- 如果对任意的 $x_1, x_2 \in D, \alpha \in (0, 1)$ 都有 $f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) < \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2)$, 则称 f 是 D 上的严格凸函数(strictly convex function)。
- 若 f 为凸函数, 则 $-f$ 为凹函数(concave function)。



凸函数举例




图 5: 凸函数示例

- 下列函数均为 \mathbb{R}^n 上的凸函数: $f(x) = c^T x$

$$f(x) = \|x\|$$

$$f(x) = x^T A x, \text{ 其中 } A \text{ 为对称正定矩阵}$$



凸函数的 α 水平集

- $f(x)$ 是定义在 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数, $\alpha \in \mathbb{R}$, 集合 $D_\alpha = \{x|f(x) \leq \alpha, x \in D\}$ 称作 f 函数的 α 水平集(level set)。
- 求证非空凸集 D 上凸函数 f 的任意水平集 D_α 是凸集。
- 证明: 对任意 $x_1, x_2 \in D_\alpha$, 有 $f(x_1) \leq \alpha, f(x_2) \leq \alpha$, 对任意的 $\lambda \in (0, 1)$, 有 $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \leq \lambda\alpha + (1 - \lambda)\alpha = \alpha$
- 所以 $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in D_\alpha$, 所以 D_α 是凸集。

凸函数的 α 水平集




图 6: 水平集示例

图中展示了某一函数（不一定是凸函数）的水平集



目录

凸集

投影定理

凸集的分离定理

凸函数

凸函数的判别定理





凸函数的判别定理1

定义在 \mathbb{R}^n 上的 $f(\mathbf{x})$ 为凸函数的充要条件是对于任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ，一元函数 $\phi(\alpha) = f(\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y})$ 是关于 α 的凸函数。

证明：必要性

- 设 $\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \lambda_1 + \lambda_2 = 1$ ，由 $\phi(\alpha)$ 的定义和 $f(\mathbf{x})$ 的凸性，有：

$$\begin{aligned}\phi(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) &= f(\mathbf{x} + (\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2)\mathbf{y}) \\ &= f(\lambda_1\mathbf{x} + \lambda_2\mathbf{x} + (\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2)\mathbf{y}) \\ &= f(\lambda_1(\mathbf{x} + \alpha_1\mathbf{y}) + \lambda_2(\mathbf{x} + \alpha_2\mathbf{y})) \\ &\leq \lambda_1 f(\mathbf{x} + \alpha_1\mathbf{y}) + \lambda_2 f(\mathbf{x} + \alpha_2\mathbf{y}) \\ &= \lambda_1\phi(\alpha_1) + \lambda_2\phi(\alpha_2)\end{aligned}$$

- 由定义知 $\phi(\alpha)$ 是凸函数。



凸函数的判别定理1

证明：充分性

- 任取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, 记 $\mathbf{x} = \mathbf{x} + 0(\mathbf{y} - \mathbf{x}), \mathbf{y} = \mathbf{x} + 1(\mathbf{y} - \mathbf{x}), \phi(\alpha) = f(\mathbf{x} + \alpha(\mathbf{y} - \mathbf{x}))$, 则对于 $\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \lambda_1 + \lambda_2 = 1$

$$\begin{aligned} f(\lambda_1 \mathbf{x} + \lambda_2 \mathbf{y}) &= f(\lambda_1(\mathbf{x} + 0(\mathbf{y} - \mathbf{x})) + \lambda_2(\mathbf{x} + 1(\mathbf{y} - \mathbf{x}))) \\ &= f(\mathbf{x} + (0\lambda_1 + 1\lambda_2)(\mathbf{y} - \mathbf{x})) \\ &= \phi(0\lambda_1 + 1\lambda_2) \\ &\leq \lambda_1 \phi(0) + \lambda_2 \phi(1) \\ &= \lambda_1 f(\mathbf{x}) + \lambda_2 f(\mathbf{y}) \end{aligned}$$

- 所以 $f(\mathbf{x})$ 是凸函数。



凸函数的判别定理2

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是非空开凸集, $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $f(x)$ 在 D 上一阶连续可微, 则 $f(x)$ 是 D 上的凸函数的充要条件是:

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x), \forall x, y \in D$$

证明: 必要性

- 设 $f(x)$ 是 D 上的凸函数, 则 $\forall \alpha \in (0, 1)$, 有

$$f(\alpha y + (1 - \alpha)x) \leq \alpha f(y) + (1 - \alpha)f(x),$$

$$\text{故 } \frac{f(x + \alpha(y - x)) - f(x)}{\alpha} \leq f(y) - f(x)$$

- 由 Taylor 展开式可知:

$$f(x + \alpha(y - x)) - f(x) = \alpha \nabla f(x)^T (y - x) + o(\alpha \|y - x\|)$$

$$\text{因此得到: } \nabla f(x)^T (y - x) + \frac{o(\alpha \|y - x\|)}{\alpha} \leq f(y) - f(x)$$

- 两边取 $\alpha \rightarrow 0$ 的极限, 有 $\nabla f(x)^T (y - x) < f(y) - f(x)$, 比凸函数的条件更为严格 (此处是 $<$, 凸函数只要求 \leq)
- 必要性得证



凸函数的判别定理2

证明：充分性

- 设 $\nabla f(x)^T(y - x) \leq f(y) - f(x), \forall x, y \in D, \forall \alpha \in (0, 1)$
取 $\bar{x} = \alpha x + (1 - \alpha)y$, 由于 D 是凸集, 所以 $\bar{x} \in D$
- 依据 $x, \bar{x} \in D; y, \bar{x} \in D$, 分别有:
 $f(\bar{x}) + \nabla f(\bar{x})^T(x - \bar{x}) \leq f(x), \forall x \in D$
 $f(\bar{x}) + \nabla f(\bar{x})^T(y - \bar{x}) \leq f(y), \forall y \in D$
- 上两式分别乘以 $\alpha, (1 - \alpha)$, 相加得
 $f(\bar{x}) + \nabla f(\bar{x})^T(\alpha x + (1 - \alpha)y - \bar{x}) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$
- 又因为已知 $\bar{x} = \alpha x + (1 - \alpha)y$, 得到
 $f(\bar{x}) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$
即 $f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$
- 对任意的 $\alpha \in (0, 1)$ 成立, 所以可知 $f(x)$ 是凸集 D 上的凸函数。



凸函数的判别定理2

- 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是非空开凸集, $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $f(x)$ 在 D 上一阶连续可微, 则 $f(x)$ 是 D 上的严格凸函数的充要条件是:
$$f(y) > f(x) + \nabla f(x)^T(y - x), \forall x, y \in D \text{ 且 } x \neq y$$



凸函数的判别定理3

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是非空开凸集, $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $f(x)$ 在 D 上二阶连续可微, 则 $f(x)$ 是 D 上的凸函数的充要条件是:

$f(x)$ 的Hesse矩阵 $\nabla^2 f(x)$ 在 D 上是半正定的。

证明：必要性

- 任取 $\bar{x} \in D$, 由 D 是开凸集知, $\forall x \neq 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\alpha \in (0, \delta)$ 时, 有 $\bar{x} + \alpha x \in D$, 由于 $f(x)$ 是 D 上的凸函数, 因此根据判别定理2有:

$$f(\bar{x}) + \alpha \nabla f(\bar{x})^T x \leq f(\bar{x} + \alpha x), \forall x \in D$$

- 又由于 $f(x)$ 二阶连续可微, 所以按照二阶Taylor展开式有 $f(\bar{x} + \alpha x) = f(\bar{x}) + \alpha \nabla f(\bar{x})^T x + \frac{1}{2} \alpha^2 x^T \nabla^2 f(\bar{x})^T x + o(\|\alpha x\|^2)$
- 所以 $\frac{1}{2} \alpha^2 x^T \nabla^2 f(\bar{x})^T x + o(\|\alpha x\|^2) \geq 0, \forall x \in D$
- 将上式两边同除以 α^2 , 并令 $\alpha \rightarrow 0$, 得 $x^T \nabla^2 f(\bar{x})^T x \geq 0, \forall x \in D$
- 所以 $\nabla^2 f(\bar{x})$ 在 D 上是半正定的。



凸函数的判别定理3

证明：充分性

- 设 $\nabla^2 f(\bar{x})$ 在 D 上是半正定的，对 $\bar{x}, x \in D$ 将 $f(x)$ 在 \bar{x} ($\bar{x} \in D$)处作Taylor展开：

$$f(x) = f(\bar{x}) + \nabla f(\bar{x})^T(x - \bar{x}) + \frac{1}{2}(x - \bar{x})^T \nabla^2 f(\hat{x})^T(x - \bar{x})$$
$$\hat{x} = \lambda x + (1 - \lambda)\bar{x}, \lambda \in (0, 1)。$$

- 由于 D 是凸集，所以 $\hat{x} \in D$,
- 又因为 $(x - \bar{x})^T \nabla^2 f(\hat{x})^T(x - \bar{x}) \geq 0$ ，所以 $f(x) \geq f(\bar{x}) + \nabla f(\bar{x})^T(x - \bar{x})$,
- 所以根据判别定理2有 $f(x)$ 是 D 上的凸函数。



凸函数的判别定理4

- 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是非空开凸集, $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $f(x)$ 在 D 上二阶连续可微, 则 $f(x)$ 的 Hesse 矩阵 $\nabla^2 f(x)$ 在 D 上正定 $\Rightarrow f(x)$ 是 D 上的严格凸函数;

$f(x)$ 是 D 上的严格凸函数 $\Rightarrow f(x)$ 的 Hesse 矩阵 $\nabla^2 f(x)$ 在 D 上半正定。

- 几个反例: $y = x^4, x \in \mathbb{R}, y = x^6, x \in \mathbb{R}$
- 导致充分严格凸函数与严格正定不构成互为充要条件的原因:

对于 $\alpha > 0$, 如果当 $\alpha \rightarrow 0$ 时 $o(\alpha) > 0$ 且 $o(\alpha) \rightarrow 0$, 则有

$$f(\mathbf{x}) + \frac{o(\alpha)}{\alpha} < 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \Rightarrow f(\mathbf{x}) < 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

$$f(\mathbf{x}) + \frac{o(\alpha)}{\alpha} > 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \Rightarrow f(\mathbf{x}) \geq 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

$$f(\mathbf{x}) + \frac{o(\alpha)}{\alpha} \leq 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \Rightarrow f(\mathbf{x}) < 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

$$f(\mathbf{x}) + \frac{o(\alpha)}{\alpha} \geq 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \Rightarrow f(\mathbf{x}) \geq 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$



Thank you for your
attention!

翟卫欣 副教授

zhaiweixin@cau.edu.cn

中国农业大学信息与电气工程学院